

تم تحميل وعرض المادة من :



موقع واجباتي
www.wajibati.net

موقع واجباتي منصة تعليمية تساهم بنشر حل المناهج الدراسية بشكل متميز لترتقي بمجال التعليم على الإنترنت ويستطيع الطلاب تصفح حلول الكتب مباشرة لجميع المراحل التعليمية المختلفة


خرائط مفاهيم الفصل الأول: الجاذبية

حركة الكواكب
والجاذبية

- ① كان يعتقد قديماً أن الشمس والقمر والكواكب والنجوم تدور كلها حول الأرض، إلا أن العالم كوبرنيكس لاحظ أن المشاهدات المتوافرة لحركة الكواكب لا تتفق كلياً مع هذا النموذج الذي مركزه الأرض.
- ② جاء تايكو براهي بعد سنوات قليلة من موت كوبرنيكس واستعمل أجهزة صممها بنفسه وتوصل خطأ - كما سيتبين لك - إلى أن الشمس والقمر يدوران حول الأرض بينما الكواكب الأخرى تدور حول الشمس.
- ③ درّب تايكو براهي مساعديه على كيفية استعمال الأجهزة المبنية الآتية ومن مساعديه يوهان كبلر الألماني.
- ④ عندما تُوفي تايكو براهي ورث كبلر نتائج مشاهدته، ودرس البيانات، وكان مقتنعاً أن علمي الهندسة والرياضيات جديران أن يوصلا عدد الكواكب وأبعادها وحركاتها . وبعد عدة سنوات اكتشف كبلر القوانين التي تصف حركة كل كوكب.




الأجهزة التي ابتكرها
علماء المسلمين
واستعملها براهي



النص:
" أن مدارات الكواكب إهليلجية، وتكون الشمس في إحدى البؤرتين".

قانون كبلر الأول



النص: الخط الوهمي من الشمس إلى الكوكب يمسح مساحات متساوية في أزمنة متساوية. حيث وجد كبلر أن الكواكب تتحرك بسرعة أكبر من عندما تكون قريبة من الشمس.

قانون كبلر الثاني

النص: أن مربع النسبة بين زمنين لكوكبين حول الشمس يساوي مكعب النسبة بين متوسطي يعديهما بين الشمس.

$$\left(\frac{r_A}{r_B}\right)^3 = \left(\frac{T_A}{T_B}\right)^2$$

الصيغة الرياضية:

قانون كبلر الثالث

ملاحظة: القانونين الأول والثاني يطبقان على كل كوكب على حدة، أما القانون الثالث فيربط بين حركة أكثر من كوكب حول الجسم نفسه. لذا يستعمل قانون كبلر الثالث لمقارنة الأبعاد والأزمنة الدورية للقمر والأقمار الاصطناعية حول الأرض.

تسير المذنبات في مدارات إهليلجية، وتقسم إلى مجموعتين اعتماداً على الزمن الدوري لها:

المذنبات

مثل مذنب هال - بوب حيث زمنه الدوري 2400 سنة.


① أكبر من 200 سنة

أقسام المذنبات لها زمن دوري

مثل مذنب هالي حيث زمنه الدوري 76 سنة.

② أقل من 200 سنة

النص: أن الأجسام تجذب أجساماً أخرى بقوة تتناسب طردياً مع حاصل ضرب كتلتها، وعكسياً مع مربع المسافة بين مراكزها.



$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$


الصيغة الرياضية:

ملاحظة: يتبع تغير قوة الجاذبية بتغير المسافة قانون التربيع العكسي

كما في الشكل الآتي:

قانون الجذب الكوني لنيوتن

الزمن الدوري لكوكب يدور حول الشمس يتناسب طردياً مع الجذر التربيعي لمكعب نصف قطره المداري.



$$T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{Gm_s}}$$

الصيغة الرياضية:

قانون نيوتن للجذب الكوني و قانون كبلر الثالث


استعمل العالم هنري كافندش جهاز كما في الشكل.

الهدف منها: قياس قوة الجاذبية بين الجسمين. قياس ثابت الجذب الكوني.

ملاحظة: عند وضع الكرات الكبيرة بالقرب من الصغيرة تؤدي قوة الجاذبية إلى دوران الذراع. ويقاس الدوران بمساعدة الشعاع الضوئي المنعكس.



تجربة كافندش




تسمى تجربة كافندش أحياناً بتجربة "إيجاد وزن الأرض" لأن تجربته ساعدت على حساب كتلة الأرض. تكمن أهمية الثابت من خلاله يمكن:

أهمية ثابت كافندش

- ① حساب كتلة الأرض ② حساب كتلة الشمس ③ حساب قوة الجاذبية بين أي كتلتين.

يتحرك القمر الاصطناعي الذي يدور على ارتفاع ثابت عن الأرض حركة دائرية منتظمة.

يعطى مقدار سرعة القمر الاصطناعي الذي يدور حول الأرض بعد دمج قانون القوة المركزية مع قانون الجذب الكوكبي:



$$v = \sqrt{\frac{G m_E}{r}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{G m_E}}$$

أما الزمن الدوري للقمر الاصطناعي حول الأرض يُعبر عنه بالعلاقة:
ملاحظة هامة: من القانون تستطيع معرفة العوامل المؤثرة في الزمن الدوري للقمر الاصطناعي الذي يدور حول الأرض.

مدارات الكواكب
والأقمار الاصطناعية



يزودنا القمر الاصطناعي لاندسات 7 كما في الشكل الآتي بصور سطحية للأرض.
ومسج للمصادر الأرضية والخامات والتغيرات التي تحدث على الكرة الأرضية.
وتبلغ كتلته 2200 Kg ويدور حول الأرض على ارتفاع 705 Km .
وكلما زادت كتلة القمر تطلب صاروخاً أقوى لإيصاله إلى مداره.

كتلة القمر الاصطناعي

يمكن إيجاد تسارع الأجسام الناشئ عن الجاذبية الأرضية بدمج قانون نيوتن الثاني وقانون الجذب الكوني فنحصل على

$$g = G \frac{m_E}{r_E^2}$$

ملاحظة: كلما ابتعدت عن الأرض فإن التسارع الناتج عن الجاذبية الأرضية يقل تبعاً لعلاقة التربيع العكسي هذه.

تسارع الجاذبية
الأرضية



في الشكل الآتي يختبر أحد رواد الفضاء ظاهرة انعدام الوزن في مكوك الفضاء كولومبيا
على ارتفاع 400 km أي عند $g = 8.7 \text{ m/s}^2$.
علل: لماذا يبدو رواد الفضاء عديمي الوزن بالرغم من أن قوة الجاذبية لا تساوي صفر؟
السبب/ أن الوزن الظاهري لهم يساوي صفر حيث يشعروا بانعدام الوزن لأنهم
يتسارعون بالكيفية نفسها.

الوزن وانعدام الوزن

التعريف: كل جسم له كتله يؤثر بمجال يؤثر من خلاله بقوة في أي جسم آخر محيط به.

$$g = \frac{GM}{r^2}$$

الصيغة الرياضية:

مثال: تتجه كل المتجهات الممثلة لمجال الجاذبية في اتجاه مركز الأرض.
ويضعف المجال كلما ابتعدنا عن الأرض.

مجال الجاذبية





التعريف: الكتلة المرتبطة بقصور الجسم.

$$m_{\text{القصور}} = \frac{F_{\text{محصلة}}}{a}$$

الصيغة الرياضية:

تقاس كتلة القصور: بالتأثير بقوة في الجسم ثم قياس تسارعه باستعمال ميزان القصور.

① كتلة القصور

نوعا
الكتلة



التعريف: الكتلة المرتبطة بقوة الجاذبية بين الأجسام.

$$m_{\text{الجاذبية}} = \frac{r^2 F_{\text{الجاذبية}}}{G m}$$

الصيغة الرياضية:

تقاس كتلة الجاذبية: باستعمال الميزان ذو الكفتين.


② كتلة الجاذبية

مبدأ
التكافؤ

النص: أن كتلة القصور وكتلة الجاذبية متساويتان من حيث المقدار.

مثال توضيحي: أن لديك صندوق في سيارة وتحركت إلى الأمام فإن الصندوق يتدحرج إلى الخلف بسبب كتلة القصور التي تقاوم التسارع وأما إذا بدأت السيارة في الصعود لأعلى فإنها فإن الصندوق ستدحرج للخلف مرة أخرى بسبب كتلة الجاذبية لأسفل في اتجاه الأرض.


نظرية أينشتاين في الجاذبية



افترض أينشتاين أن الجاذبية ليست مجرد قوة، بل هي تأثير من الفضاء نفسه، وبناءً على فرضية أينشتاين فإن الكتل تغير الفضاء (الزمكان) المحيط بها، فتجعله منحنياً، وتتسارع الأجسام الأخرى بسبب الطريقة التي تسير بها في هذا الفضاء المنحني.

تنبؤات نظرية أينشتاين في الجاذبية (النظرية النسبية العامة):

- 1- تنبأت حول كيفية تأثير الأجسام ذات الكتل الكبيرة... في الضوء.
- 2- تنبأت بانحراف الضوء عند مروره بالقرب من أجسام ذات كتل كبيرة جداً.
- 3- ومن نتائجها تأثير الأجسام ذات الكتل الكبيرة في الضوء فإذا كانت كتلة الجسم كبيرة جداً وكثافته كبيرة بشكل كاف فإن الضوء الخارج منه يرتد إليه بشكل كامل وبالتالي لا يستطيع الخروج منه أبداً وتسمى مثل هذه الأجسام بـ الثقوب السوداء.



خرائط مفاهيم الفصل الثاني:
الحركة الدورانية

لقياس مستواك التحصيلي بالمادة
يمكن تحميل تطبيق فيزياء المرحلة الثانوية



تعريفها: هي التغير في الزاوية أثناء دوران الجسم.
رمزها θ ... وتقرأ .. ثيتا ... وتقاس بوحدة .. rad. راديان

وقد اعتبر اتجاه الدوران إذا كان مع عقارب الساعة يُعد .. سالباً
وإذا كان اتجاه الدوران عكس عقارب الساعة يُعد .. موجباً

الإزاحة الزاوية

تعريفها: هي التغير في الإزاحة الزاوية خلال الزمن.
رمزها ω ... وتقرأ .. أوميغا ... وتقاس بوحدة .. rad/s ... وتحسب بالعلاقة

$$\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$$

السرعة الزاوية

تعريفه: هو التغير في السرعة الزاوية خلال الزمن.
رمزه α ... ويقرأ .. ألفا ... ويقاس بوحدة .. rad/s² ... وتحسب بالعلاقة

$$\alpha = \frac{\Delta \omega}{\Delta t}$$

التسارع الزاوي

ملخص العلاقة بين كميات
الحركة الخطية والحركة الزاوية

<p>٣- التسارع:</p> $a = r \cdot \alpha$ <p>التسارع الخطي ← التسارع الزاوي</p> <p>له نصف القطر</p>	<p>٢- السرعة المتجهة:</p> $v = r \cdot \omega$ <p>السرعة الخطية ← السرعة الزاوية</p> <p>له نصف القطر</p>	<p>١- الإزاحة:</p> $d = r \cdot \theta$ <p>الإزاحة الخطية ← الإزاحة الزاوية</p> <p>له نصف القطر</p>
---	--	---

التردد الزاوي: تعريفه: هو عدد الدورات الكاملة التي يدور بها الجسم في الثانية الواحدة.
ورمزه (..... f.....) ويقرأ .. آفي ... ووحدته (Hz) أو (rad/s) ويحسب بالعلاقة الرياضية:

$$f = \frac{\omega}{2\pi}$$

التردد

في الكيمياء رمزه (V) ويقرأ **نيو** وكلاهما صحيح



العزم

تعريف العزم: هو مقياس لقدرة القوة على إحداث الدوران
 ورمزه « τ » ويقراً «تأثير»

والعوامل المؤثرة في العزم هي: القوة المؤثرة (F) و ذراع القوة (L) هو المسافة العمودية من محور الدوران حتى نقطة تأثير القوة.

$L = r \sin \theta$

تأثير قليل لا تأثير

نصف قطر الدوران (m) القوة (N)

ويحسب العزم من العلاقة الآتية: القوة و ذراعها $\tau = F r \sin \theta$ الزاوية المحصورة بين

ويمكن إيجاد محصلة العزوم بالعلاقة: $\tau_1 + \tau_2 = 0$ $\tau = 0$ المحصلة

تعريفه: عبارة عن نقطة في الجسم تتحرك بالطريقة نفسها التي يتحرك بها الجسم النقطي.
 * ويحدد موقع مركز الكتلة لجسم ما من خلال مركزه الهندسي إذا كان منتظماً



مركز الكتلة

في حالة الجسم غير منتظم يمكن إيجاد مركز الكتلة من خلال تعليقه ورسم

(b) يمكن إيجاد مركز الكتلة لجسم مثل مضرب تنس بتعليقه من أي نقطة ثم تكرار تعليقه من نقطة أخرى (c) النقطة التي تتقاطع عندها الخطوط المرسومة هي مركز كتلة المضرب الخط الرأس من نقطة التعليق الأولى والثانية متطقتان هي مركز الكتلة



شرطا الاتزان: حتى يكون الجسم في حالة اتزان ميكانيكي يجب توافر شرطين هما:

١- أن يكون متزن انتقالي أي أن محصلة القوى المؤثرة فيه = صفر $\sum F = 0$

٢- أن يكون متزن دوراني أي أن محصلة العزوم المؤثرة فيه = صفر $\sum \tau = 0$

الاتزان



يرى مراقب على الأرض أن المقذوفات الترابية تطلق إلى

الفضاء لتعود إلى الأرض لسبب قوة جاذبية الأرض.

هي قوة ظاهرية غير حقيقية تبدو كأنها ترف الجسم المتحرك عن مساره بخط مستقيم ولا يمكن ملاحظتها إلا في نظام إحداثيات يدور مع الجسم مثل شعورك بالانزفاع نحو الباب عند المتطف

القوة الطاردة المركزية

خرائط مفاهيم الفصل الثالث: الزخم وحفظه

مثال توضيحي

تعريف الزخم: هي كمية الحركة لجسم ما ويساوي حاصل ضرب كتلة الجسم في سرعته.


ورمزه P ... ويقاس بوحدة $(\text{kg} \cdot \text{m/s})$ وهو كمية متجهة

ويحسب بالعلاقة: سرعة الجسم (m/s) \rightarrow $P = m \cdot v$ \leftarrow زخم الجسم

كتلة الجسم (وكيل) (kg)

$m = 2200 \text{ kg}$

$v = 94 \text{ km/h}$



الزخم


تعريف الدفع: هو متوسط القوة المؤثرة في الجسم في فترة زمنية معينة.

ورمزه (I) ويقاس بوحدة $(\text{N} \cdot \text{s})$ ويحسب بطريقتين:

بيانياً: يساوي المساحة المحصورة تحت منحنى (القوة - الزمن)

حسابياً: $I = F \Delta t \Rightarrow$ الدفع = $F \Delta t$

وهو كمية متجهة



الدفع

العلاقة بين الدفع والزخم ((نظرية الدفع والزخم))

النص: «الدفع على جسم ما يساوي التغيير في زخمه»

العلاقة الرياضية: $F \Delta t = \Delta P \Leftrightarrow F \Delta t = P_f - P_i$

$F \Delta t = m(v_f - v_i)$

الفترة الزمنية

متوسط القوة

الدفع

الزخم

الكتلة

السرعة

حاصل الضرب هو

ينتج تغيراً في

حاصل الضرب هو



استناداً لقانون نيوتن الثالث في الحركة ...
وجابون حفظ الزخم فإن الصوتان المؤثرتان في
جسمين متصادمين معاً متساويتين في المقدار
ومتعاكستين في الاتجاه.

العلاقة بين قانون نيوتن
الثالث وحفظ الزخم

شروط حفظ الزخم:


١- أن يكون النظام مغلق: لا يوجد فقد أو اكتساب للكتل

٢- أن يكون النظام معزول: لا توجد قوى خارجية مؤثرة في النظام

P_{Ci}

P_{Di}

النص: زخم أي نظام مغلق ومعزول لا يتغير




الصيغة الرياضية: الزخم الكلي بعد التصادم $P_f = P_i$ الزخم الكلي قبل التصادم

قانون
حفظ الزخم

خرائط مفاهيم الفصل الرابع: الشغل والطاقة

تعريف الشغل: هو مقدار القوة المؤثرة في إزاحة الجسم الناتجة أي هو انتقال للطاقة بطريقة ميكانيكية.
ويرمز للشغل بالرمز W ويقاس بوحدة J أو $N \cdot m$ وهو كمية قياسية.
تعريف الجول: هو مقدار الشغل المبذول عندما تؤثر قوة مقدارها واحد نيوتن في جسم فتعمل على إزاحته 1m .

الشغل (Work)



المساحة المحصورة تحت المنحنى البياني ل (القوة - الإزاحة) .

بالعلاقة الرياضية: $W = Fd \cos \theta$ أو $W = Fd$
بالإزاحة المحصورة بين القوة والإزاحة

بيانياً

حساب الشغل

حسابياً

تعريف الطاقة: هي مقدرة الجسم على القيام بشغل بإحداث تغيير في نفسه أو في الأشياء المحيطة به.
ويرمز للطاقة بالرمز E وتقاس بوحدة J وهي كمية قياسية.

الطاقة (Energy)

تعريف الطاقة الحركية: هي الطاقة الناتجة عن حركة الجسم.
ويرمز للطاقة الحركية بالرمز KE وتقاس بوحدة J
ويمكن حساب الطاقة الحركية بالصيغة الرياضية: $KE = \frac{1}{2} m v^2$
الطاقة الحركية (ج) ← سرعة الجسم (m/s) → له كتلة الجسم (kg)

الطاقة الحركية

النص: «الشغل المبذول على النظام يساوي التغيير في الطاقة الحركية للنظام»

الصيغة الرياضية: $W = \Delta KE \rightarrow W = \frac{1}{2} m (v_f^2 - v_i^2)$


نظرية الشغل والطاقة

تعريف القدرة: هي مقدار الشغل المبذول خلال الزمن أي المعدل الذي تنتقل فيه الطاقة.
ويرمز للقدرة بالرمز P وتقاس بوحدة J/s أو W
تعريف الواط: $P = \frac{W}{t} \rightarrow P = \frac{Fd}{t}$

القدرة (Power)

تعريف الآلة: هي أداة تسهل بذل الشغل لإنجاز المهمة بواسطة تغيير مقدار القوة المسببة للشغل أو اتجاهها.

الآلة




هي آلة ميكانيكية تغير اتجاه أو قيمة القوة.
مثل: مفك البراغي - فتاحة الزجاجات - البكرة

الآلات البسيطة

آلة تتركب من آتين بسيطتين أو أكثر موصولتين أو مرتبطتين
معا بحيث تصبح قوة المقاومة للآلة الأولى هي القوة المسلطة للآلة الثانية. مثل: الدراجة الهوائية - السيارة.

الآلات المركبة

أنواع الآلات



النص: هي النسبة بين قوة **المقاومة** إلى القوة المؤثرة (المسلطة).

$$MA = \frac{F_r}{F_e}$$

(MA) القوة التي أثرت بها الآلة (المقاومة) القوة التي أثرت في الآلة من الشخص (المسلطة أو المؤثرة)

الفائدة الميكانيكية
للآلة البسيطة

هي القوة التي أثرت في الآلة بواسطة شخص ما وتعرف بـ **القوة المسلطة المؤثرة**.

F_e

هي القوة التي أثرت بها الآلة وتعرف بـ **القوة المقاومة**.

F_r

الفائدة الميكانيكية للآلة المركبة: حاصل ضرب **الفوائد الميكانيكية** للآلات البسيطة التي تتكون منها.

الصيغة الرياضية: $MA = MA_{\text{الآلة 1}} \times MA_{\text{الآلة 2}}$

التعريف: هي الآلة التي يكون فيها **الشغل الناتج يساوي الشغل المبذول**... أي يستطيع نقل الطاقة كلها وتكون كفاءتها **100%**...

الآلة المثالية

النص: هي النسبة بين **الإزاحة** القوة المؤثرة المسلطة إلى **الإزاحة** قوة المقاومة.

ورمزها (IMA) أي النسبة بين المسافات المقطوعة.

الصيغة الرياضية: $IMA = \frac{d_e}{d_r}$

الفائدة الميكانيكية المثالية

ملاحظة: الفائدة الميكانيكية (MA) لجميع الآلات على أرض الواقع **أقل** من **IMA**.

التعريف: هي نسبة الشغل الناتج (W_o) إلى الشغل المبذول (W_i) .

$$e = \frac{W_o}{W_i} \times 100$$

لا تغطي **بدلالة الشغل** نظر

كفاءة الآلة

$$e = \frac{MA}{IMA} \times 100$$

وبدلالة **الفائدة الميكانيكية** و**الفائدة الميكانيكية المثالية**

خرائط مفاهيم الفصل الخامس:
الطاقة وحفظها

الأشكال المتعددة للطاقة

$$KE = \frac{1}{2} m v^2$$

هي الطاقة الناتجة عن حركة الجسم في خط. وتحسب بالعلاقة: $KE = \frac{1}{2} m v^2$
وتعتمد على كتلة الجسم (m) و سرعة الجسم (v)

خطية

الطاقة الحركية

دورانية

هي الطاقة الناتجة عن حركة الجسم الدائري (الحركة الدورانية).
وتعتمد على سرعة الجسم الزاوية و توزيع كتلة الجسم

هي الطاقة المخزنة في النظام والناتجة عن قوة الجاذبية..... بين الأرض والجسم.
ويرمز لها بالرمز (PE.....) وتقاس بوحدة (J.....)

$$PE = m g h$$

وتحسب بالصيغة الرياضية: الارتفاع عن سطح الأرض (m)
تسارع الجاذبية الأرضية $g = 9,8 \text{ m/s}^2$
كتلة الجسم (kg)

طاقة وضع الجاذبية

تعريف مستوى الإسناد: هو المستوى الذي تكون فيه طاقة الوضع P.E. عنده صفرًا.....

هي الطاقة المخزنة في النظام نتيجة تغير شكل الجسم.....
مثل: الطاقة المخزنة في الوتر المشدود ومنصات القفز والأربطة المطاطية.

طاقة الوضع المرورية

هي الكتلة المتحوّلة إلى طاقة عندما يتحرك الجسم بسرعة الضوء.....

$$E_0 = m c^2$$

وتحسب بالعلاقة الرياضية: $E_0 = m c^2$
سرعة الضوء $= 3 \times 10^8 \text{ m/s}$
كتلة الجسم

الطاقة السكونية

هي مجموع طاقتي الحركة والوضع في النظام إذا لم يكن هناك أنواع أخرى من الطاقة.

ويرمز لها بالرمز (E.....) وتقاس بوحدة (J.....)




$$E = KE + PE$$

الطاقة الميكانيكية

وتكتب بالصيغة الرياضية: $E = KE + PE$

النص: أن الطاقة في النظام المغلق و المعزول .. لا تفنى ولا تستحدث من العدم بل تبقى محفوظة. وتتحول من شكل لآخر بحيث يبقى المجموع الكلي للطاقة في النظام ثابت.

قانون حفظ الطاقة



النص: إن مجموع الطاقة الحركية وطاقة الوضع في النظام قبل وقوع الحدث يساوي مجموع الطاقة الحركية وطاقة الوضع في النظام بعد الحدث.

قانون حفظ الطاقة الميكانيكية

الصيغة الرياضية: $KE_{قبل} + PE_{قبل} = KE_{بعد} + PE_{بعد}$

هو النظام الذي لا يكتسب كتلة أو يفقدها





النظام مغلق

شروط حفظ الطاقة الميكانيكية

هو النظام الذي تكون مجسدة القوى الخارجية صفر.

النظام معزول

إذا تصادم الجسمان؟؟



هو التصادم الذي تكون فيه الطاقة الحركية بعد التصادم أكبر من الطاقة الحركية قبل التصادم.

مثل: انفلات نابض مضغوط في حالة تصادم عربتين.

فوق المرن
أو الانفجاري

هو التصادم الذي تكون فيه الطاقة الحركية قبل وبعد التصادم لا تتغير. مثل معد نيوتن.

أي أن الطاقة الحركية قبل التصادم يساوي الطاقة الحركية بعد التصادم.

وعادة ما تسمى التصادمات التي تحدث بين الأجسام المرنة الصلبة بالتصادم مرن.

مثل: التصادم الذي يحدث بين الأجسام المصنوعة من الفولاذ والزجاج أو البلاستيك الصلب.

مرن

أنواع التصادم

ملاحظة: التصادمات لا بد أن تحدث تغيراً في الطاقة وهذا التغير بسيط يمكن إهماله ومكافئ على التصادمات المرنة المثالية / التصادمات الذرية في الفيزياء.

عديم المرونة

هو التصادم الذي تقل فيه الطاقة الحركية.

أي أن الطاقة الحركية بعد التصادم أقل من الطاقة الحركية قبل التصادم.

حيث يتحول جزء من الطاقة الحركية إلى طاقة حرارية.

مثل: التصادم الذي يحدث بين الأجسام المصنوعة من مواد لزجة أو ناعمة مثل الطين.

خرائط مفاهيم الفصل السادس: الطاقة الحرارية

التعريف: هي دراسة تحولات الحرارة من شكل لآخر من أشكال الطاقة.


الديناميكا الحرارية

التعريف: هي الطاقة الكلية للجزيئات ويرتبط متوسط الطاقة لكل جزيء بدرجة الحرارة.

الطاقة الحرارية

التعريف: هي الحالة التي يصبح عندها معدل تدفق الطاقة بين جسمين متساويين. ويكون لكلا الجسمين درجة الحرارة نفسها.

الاتزان الحراري




يعتمد عمل مقياس الحرارة على خاصية فيزيائية معينة مثل الحجم، والذي يتغير بتغير درجة الحرارة. حيث:

المقياس الحراري

١- مقياس الحرارة المنزلية تحتوي على كحول ملون **يتمدد**. عندما يسخن ويرتفع داخل أنبوب ضيق، وكلما زادت درجة حرارة الكحول تمدد حجمه أكثر فزاد ارتفاعه في الأنبوب، مشيراً إلى درجة حرارة أعلى.

٢- مقياس الحرارة السائلة البلورية بحيث تترتب بلورات الجزيئات لكل نوع عند درجة حرارة محددة مما يؤدي إلى تغير لون البلورة وبالتالي تشير إلى درجة الحرارة من خلال اللون.

٣- مقياس الحرارة الطبية والمقاييس المستخدمة في محركات المركبات تستخدم دوائر إلكترونية حساسة للحرارة فتقيس درجات الحرارة بسرعة.



الشكل 5-6 مقاييس درجة الحرارة الثلاثة الشائعة وهي الكلفن، والسلسيوس، والفهرنهايت.

يعتمد على خصائص الماء بحيث نقطة تجمد الماء في هذا المقياس 0°C ، ونقطة غليان الماء النقي عند مستوى سطح البحر 100°C . وهذا مفيد في القياسات اليومية لدرجات الحرارة لكنه غير عملي؟
لأنه... **يحتوي على درجات سالبة**.....

السلسيوس

مقياسا درجة الحرارة

بحيث نقطة تجمد الماء في هذا المقياس 273°K ، ونقطة غليان الماء النقي عند مستوى سطح البحر 373°C .

الكلفن

الصيغة الرياضية للتحويل بين مقياس السلسيوس والكلفن: $T_K = T_C + 273$

درجة الحرارة على مقياس سلسيوس

الحرارة

التعريف: هي الطاقة التي تنتقل تلقائياً من الجسم الأسخن إلى الجسم الأبرد . رمزها (.....)
وتقاس بوحدة (.....)
وتكون سالبة القيمة إذا **انبعتت** ... من الجسم حرارة وموجبة القيمة إذا **امتصت** .. الجسم حرارة.

التوصيل

انتقال الحرارة في **المواد الجامدة**. بتصادم الجزيئات مع بعضها البعض مباشرة.
مثل: انتقال الحرارة في قضيب معدني ند تقريبه من مصدر حراري (لهب).

الحمل

انتقال الحرارة في **الموائع** ... (السوائل والغازات) بسبب اختلاف درجة الحرارة.
مثل: غيان الماء في دورق - نقل الهواء للحرارة.

الإشعاع

انتقال الحرارة عن طريق الأمواج الكهرومغناطيسية ويحدث في **الفراغ** ولا يشترط وجود مادة.
مثل: تسخين الشمس للأرض.

طرق

انتقال

الحرارة

السعة
الحرارية
النوعية

الحرارة النوعية:

التعريف: هي كمية الطاقة التي يجب أن تكتسبها المادة لترتفع درجة حرارة وحدة الكتل من هذه المادة درجة
سليزية واحدة. ورمزها (.....) وتقاس بوحدة (.....)
.....

الصيغة الرياضية: يمكن حساب كمية الحرارة اللازم نقلها لتغيير درجة حرارة الجسم النوعية

$$Q = m c \Delta T \quad \text{حيث} \quad \Delta T = T_f - T_i$$

التغير في درجة الحرارة

كتلة الجسم (ك)

مقياس حرارة

قضب تحريك

غطاء

الوعاء المعزول

ماء

الوعاء الداخلي

مادة الاختبار

مقياس حرارة

قضب تحريك

غطاء

الوعاء المعزول

ماء

الوعاء الداخلي

مادة الاختبار

مقياس حرارة

قضب تحريك

غطاء

الوعاء المعزول

ماء

الوعاء الداخلي

مادة الاختبار

استخدامه: قياس التغير في الطاقة الحرارية.....

تركيبه: ... كما في الشكل

مبدأ عمله: يعتمد على مبدأ حفظ الطاقة.....

الصيغة الرياضية: حساب درجة الحرارة النهائية للنظام:

A: المادة الأولى B: المادة الثانية

$$T_f = \frac{m_A C_A T_A + m_B C_B T_B}{m_A C_A + m_B C_B}$$

m الكتلة c الحرارة النوعية T درجة الحرارة

المسعر


الربط مع الأحياء: تقسم الحيوانات اعتماداً على درجة حرارة الأجسام إلى مجموعتين:

1. حيوانات متغيرة درجة الحرارة. حيث تتغير تبعاً للبيئة المحيطة.....
2. حيوانات ثابتة درجة الحرارة. حيث تتحكم في درجة حرارة أجسامها داخلياً.....

الحالات الأكثر شيوعاً للمادة

١. الصلبة ٢. السائلة ٣. الغازية ٤. بلازما

حالات المادة



التعريف: هي الدرجة التي عندها تتحول المادة من الحالة **الصلبة**... إلى الحالة **السائلة**...
ملاحظة: في أثناء انصهار المادة أو غليانها تعمل الطاقة الحرارية المكتسبة على التغلب على القوى التي تربط الجزيئات مع بعضها لذا تبقى درجة حرارتها **ثابتة**.....

درجة انصهار المادة

التعريف: هي الدرجة التي عندها تتحول المادة من الحالة **السائلة**... إلى الحالة **الغازية**...
ملاحظة: في أثناء انصهار المادة أو غليانها تعمل الطاقة الحرارية المكتسبة على التغلب على القوى التي تربط الجزيئات مع بعضها لذا تبقى درجة حرارتها **ثابتة**.....

درجة غليان المادة

الحرارة الكامنة للانصهار والتبخير لبعض المواد الشائعة

المادة	الحرارة الكامنة للانصهار H_f (J/kg)	الحرارة الكامنة للتبخير H_v (J/kg)
النحاس	2.05×10^5	5.07×10^6
الزئبق	1.15×10^4	2.72×10^5
الذهب	6.30×10^4	1.64×10^6
الميثانول	1.09×10^5	8.78×10^5
الجليد	2.66×10^5	6.29×10^6
الفضة	1.04×10^5	2.36×10^6
الرصاص	2.04×10^4	8.64×10^5
الماء (الجليد)	3.34×10^5	2.26×10^6

الحرارة الكامنة للتبخير

التعريف: هي كمية الحرارة اللازمة لتبخير 1 kg من المادة.

ورمزها (H_v)

الصيغة الرياضية:

$$Q = m H_v$$

له كتلة الجسم

الحرارة الكامنة للانصهار


التعريف: هي كمية الحرارة اللازمة لانصهار 1 kg من المادة.

ورمزها (H_f)

الصيغة الرياضية:

$$Q = m H_f$$

له كتلة الجسم



النص: التغير في الطاقة الحرارية لجسم ما يساوي مقدار كمية الحرارة المضافة إلى الجسم مطروحاً منه الشغل الذي يبذله الجسم.

الصيغة الرياضية: $Q = \Delta U + W \Rightarrow \Delta U = Q - W$

ملاحظة: يعد القانون الأول صياغة لقانون حفظ الطاقة.

القانون الأول في الديناميكا الحرارية

هي أداة لها القدرة على تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية (شغل) بصورة مستمرة.

تعريفه

المحرك

الحراري

مكوناته

مثل


كفاءته

محرك السيارة

التعريف: هي النسبة بين الشغل الناتج (W) إلى الطاقة الحرارية المعطاة (Q_H) .

$$\text{الكفاءة} = \frac{W}{Q_H} \times 100$$

الصيغة الرياضية:



بجارية... بمن مبرد... يعمل في اتجاه واحد... حيث تنتزع الحرارة من المستودع البارد وتطرد لها إلى المستودع الساخن ببذل شغل ميكانيكي.

المبرد (الثلاجة)

عبارة عن مبرد يعمل في اتجاهين... فتنتزع المضخة الحرارة من المنزل... ولذا يبرد المنزل. وأما في الشتاء فتنتزع الحرارة من الهواء البارد الذي في الخارج وتنقلها إلى داخل المنزل لتدفئته. وفي كلتا الحالتين يتطلب ذلك طاقة ميكانيكية



المضخة الحرارية « المكيف »

لنقل الحرارة من الجسم الأبرد إلى الجسم الأدفأ.

عمليات تحدث تلقائياً.

عمليات تتفق مع القانون الأول في الديناميكا الحرارية ولكن لا تحدث تلقائياً.

الإنتروبي



تعريف الإنتروبي: عبارة عن قياس لعدم الانتظام (الفوضى) في النظام. (أ.ب. العشوائية) الصيغة الرياضية: $\Delta S = \frac{Q}{T}$ ويقاس التغير في الإنتروبي بوحدة J/K مصسومة على درجة حرارة الجسم بالكلفن.

- 1- عند إضافة حرارة فإن الإنتروبي يزداد. 2- إذا انتزعت الحرارة من الجسم فإن الإنتروبي يقل.
 - 3- وعندما يبذل الجسم شغلا دون أن تتغير درجة حرارته فإن الإنتروبي يظل ثابتاً.
- الصيغة الرياضية للتغير في الإنتروبي: $\Delta S = \frac{Q}{T}$ كسبة الحرارة (J) درجة الحرارة (K) التغير في الإنتروبي (J/K)

النص: أن العمليات الطبيعية تجري في اتجاه المحافظة على الإنتروبي الكلي للكون أو زيادته.

القانون الثاني للديناميكا الحرارية «الاتجاه»

1. يعد الاختلاط التلقائي لصبغة الطعام بالماء مثال على القانون الثاني للديناميكا الحرارية.
2. انتقال الحرارة تلقائياً من الجسم الساخن إلى الجسم البارد.

أمثلة توضيحية على القانون الثاني للديناميكا